

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION CHAMPAGNE-ARDENNE

Bulletin n° 98 du 13/02/90



COLZA	Charançon de la tige	début de vol
ORGE	Jaunisse nanifiante	symptômes non encore visibles
BLE	Mouche grise Mouche jaune Mosaïque	lères pénétrations lères éclosions symptômes caractéristiques
LUZERNE	Apion des bourgeons	résultats de comptage Marne

COLZA**Charançon de la tige**Situation

Début de vol lors de périodes ensoleillées, sans vent, la semaine dernière dans les zones précoces de l'Aube (Villiers sous Praslin). Aucune capture de ce charançon en Haute-Marne et dans la Marne.

Préconisation

Dans la plupart des secteurs, il est trop tôt pour intervenir. Nous vous rappelons que l'intervention doit être réalisée dès les lères captures après la reprise de végétation, quelques jours après les lères captures avant la reprise.

ORGE**Jaunisse nanifiante**Situation

Les "jaunissements" en foyers, sur orge sont observés très souvent. Les causes peuvent être multiples (oïdium, carences, forte densité, désordres physiologiques...) mais en tout état de cause, il est impossible de diagnostiquer la J.N.O. au stade actuel

de la céréale sans une analyse virologique au laboratoire.

Préconisation

Pas d'intervention

BLE**Mouche grise**Situation

Le taux d'éclosion des oeufs a progressé puisqu'il est de l'ordre de 15%.

Les premières pénétrations ont été constatées dans l'Aube le 7 février, de même dans la Marne (Cormicy) 2% des pieds sont touchés par les larves.

Préconisation

Aucun traitement de rattrapage n'est justifié.

Mouche jauneSituation

Les lères éclosions sont observées très localement dans l'Aube. Aucune pénétration larvaire détectée.


Préconisation

Ne pas intervenir.

Ministère de l'Agriculture
Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de la Protection des Végétaux
62, avenue Nationale - La Neuville
B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX
Téléphone : 26.09.06.43

Publication périodique ABONNEMENT ANNUEL : 200F

P101



Mosaïque

Situation

En de nombreux secteurs, on constate de bonnes attaques de mosaïque sur orge :

- sur variété Plaisant (région de Chateauvillain - Andelot - St Blin - Plateau de Langres en Haute Marne).
- sur variété Express (région de la Brie dans la Marne, un cas en Haute-Marne).

Un cas de mosaïque sur blé a été observé sur variété Thésée dans le secteur de Sézanne.

Les symptômes sont à l'heure actuelle très caractéristiques sur les plus jeunes feuilles (la dernière enroulée) : des stries le long des nervures, de couleur vert clair à jaune sont très visibles.

Préconisation

Aucun traitement n'est possible contre le champignon vecteur du virus de la mosaïque.

LUZERNE


Apion des bourgeons

Situation

Une prospection dans chaque département est en cours. Elle permet de connaître les taux d'attaque à la sortie hiver et de mieux prévoir les éventuels mauvais démarrages au printemps dus à cet insecte.

Dans les différents secteurs de la Marne, les dégâts varient de 5 à 55% de bourgeons touchés. (cf carte).

TAUX D'ATTAQUE DE L'APION DES BOURGEONS (comptages février 1990)



Les lères nymphes d'apions sont observées. Le vol risque donc de reprendre très tôt si le temps doux persiste.

Préconisation

Aucun traitement sur les larves et les adultes ne peut être envisagé à l'heure actuelle car la nuisibilité de cet insecte et la période optimale de lutte sont mal connues.

PENSEZ A VOUS
REABONNER RAPIDEMENT

